




Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200 K



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

OSCILLOCOCCINUM[®] glóbulos, em tubo plástico acondicionado em blister em caixa com 3, 6, 12, 18, 24, 30 tubos.

ADMINISTRAÇÃO: Via oral.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPOSIÇÃO OSCILLOCOCCINUM[®]

Cada 1 g de glóbulos (1 dose) contém:

Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200 K 0,01 ml

Excipientes qsp 1 g glóbulos (1 dose)

Excipientes: lactose e sacarose.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?

As substâncias utilizadas na fabricação dos medicamentos homeopáticos foram estudadas em indivíduos sãos. Os sinais e sintomas desenvolvidos nessa experimentação revelaram alterações no organismo provocadas pelas substâncias. Os medicamentos homeopáticos a partir dessas substâncias são preparados em doses mínimas e a ação é inversa à provocada na experimentação.

A homeopatia está baseada na Lei da cura: «O semelhante pode curar o semelhante». Assim, as substâncias que provocam os sintomas da gripe, como dores no corpo, febre, calafrios, dor de cabeça, indisposição, são utilizadas em doses homeopáticas para auxiliar na prevenção e no tratamento desses mesmos distúrbios.

Para que este medicamento serve?

OSCILLOCOCCINUM[®] é indicado como auxiliar na prevenção e no tratamento dos estados gripais.

A **INDICAÇÃO** DESTE MEDICAMENTO SOMENTE PODERÁ SER ALTERADA A CRITÉRIO DO PRESCRITOR.

Como devo usar este medicamento?

O conteúdo completo de um tubo corresponde a uma dose.

A posologia varia conforme o momento de intervenção:

Tratamento preventivo: tomar uma dose por semana, por via oral, no Outono (Abril à Junho), prevenindo a gripe no inverno.

Início dos sintomas da gripe: tomar uma dose por via oral assim que aparecerem os primeiros sintomas da gripe. Repetir eventualmente 2 a 3 vezes, a cada 6 horas de intervalo.

Estado declarado da gripe: tomar uma dose pela manhã e uma dose à noite, durante 1 a 3 dias, por via oral.

Se os sintomas persistirem após 3 dias de uso, consulte seu médico.

MODO DE ABERTURA



1. Pegar um blister de 3 doses.



2. Apertar sobre o tubo do lado transparente para rasgar o papel



3. Retirar a dose.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento:

Os glóbulos devem estar com coloração branca uniforme, sem apresentarem manchas.

USE O MEDICAMENTO SOMENTE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO DO PRESCRITOR.

MANTENHA SEMPRE A DOSE E A FREQUÊNCIA INDICADAS PELO PRESCRITOR OU O MODO DE TOMAR SUGERIDO NESTA BULA.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO PRESCRITOR. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

SIGA A ORIENTAÇÃO DO PRESCRITOR, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.

NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO PRESCRITOR.

EM CASO DE ESQUECIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, NÃO DUPLICAR A QUANTIDADE DE MEDICAMENTO NA PRÓXIMA TOMADA.

Quando não devo usar este medicamento?

Este produto não deve ser utilizado por pessoas hipersensíveis aos componentes da fórmula.

Advertências: Informe ao prescritor o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

Intolerâncias: Este medicamento contém **LACTOSE**.

Atenção diabéticos: Contém **SACAROSE**.

Gravidez e lactação: Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião dentista.



Que males este medicamento pode causar?

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Não existem relatos de casos de superdosagem durante a utilização do medicamento OSCILLOCOCCINUM®.

Em caso de ingestão acidental, e/ou ingestão acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em casos de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu clínico ou farmacêutico.

Onde e como devo guardar este medicamento?

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletro magnética, como por exemplo: fonte de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

Armazenar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade.

PARA SUA SEGURANÇA, MANTENHA O MEDICAMENTO NA EMBALAGEM ORIGINAL ATÉ SEU USO TOTAL.

Informações Gerais:

Use o medicamento dentro do prazo de validade.

Contribua com o tratamento: relate ao prescritor todos os tratamentos que você já fez ou está fazendo. Atenda às sugestões do prescritor, para que seu tratamento seja eficaz.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento.

Siga corretamente suas orientações.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar os sintomas.

Não observando o resultado esperado, consulte o prescritor ou farmacêutico.

Não se automedique, pode ser prejudicial à saúde e dificultar o diagnóstico correto do médico.

O que devo saber sobre o medicamento homeopático?

Medicamentos homeopáticos são indicados segundo a individualidade de cada paciente, e não para doenças específicas.

A dose do medicamento homeopático é individualizada para cada paciente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas:

OSCILLOCOCCINUM® é um medicamento homeopático formulado com o extrato filtrado do coração e do fígado fresco do pato "Anas barbariae". Sua indicação está de acordo com o princípio da Homeopatia, que afirma que as substâncias capazes de desenvolver sintomas em indivíduos sadios, através da experimentação, se tornam capazes de auxiliar na prevenção e no tratamento desses sintomas nos pacientes.

Indicações terapêuticas:

OSCILLOCOCCINUM® é indicado como auxiliar na prevenção e no tratamento dos estados gripais, caracterizado pelos sintomas como cefaléia, calafrios, hipertermia e dores no corpo.

Contra-indicações:

Este produto não deve ser utilizado por pessoas hipersensíveis aos componentes da fórmula.

Intolerâncias: Este medicamento contém **LACTOSE**.

Atenção diabéticos: Contém **SACAROSE**.

Posologia sugerida:

O conteúdo completo de um tubo corresponde a uma dose.

A posologia varia conforme o momento de intervenção:

Tratamento preventivo: tomar uma dose por semana, por via oral, no Outono (Abril a Junho), prevenindo a gripe no inverno.

Início dos sintomas da gripe: tomar uma dose por via oral assim que aparecerem os primeiros sintomas da gripe. Repetir eventualmente 2 a 3 vezes, a cada 6 horas de intervalo.

Estado declarado da gripe: tomar uma dose pela manhã e uma dose à noite, durante 1 a 3 dias, por via oral.

Se os sintomas persistirem após 3 dias de uso, consulte seu médico.

Advertências:

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor.

Gravidez e lactação:

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião dentista.

Armazenagem:

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletro magnética, como por exemplo: fonte de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

Armazenar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade.

PARA SUA SEGURANÇA, MANTENHA O MEDICAMENTO NA EMBALAGEM ORIGINAL ATÉ SEU USO TOTAL.

ESTE MEDICAMENTO É HOMEOPÁTICO.

MS - 1.6916.0001

Farm.Resp.: Dra. Maria Isabel de Almeida Prado - CRF-SP no. 8111

Fabricado por: **BOIRON S.A.**

20, rue de la Libération
69110 Ste-Foy-lès-Lyon - FRANÇA

Importado e Distribuído por: **BOIRON MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS LTDA**

Rua Joaquim Floriano, 1120 conj. 41 - 04534-000
São Paulo - S.P. - CNPJ 07.498.711/0001-87
www.boiron.com.br

No. do lote, data de fabricação e

Data de validade: vide cartucho

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.



0800 724 5858

BOIRON®